



QR-kod
maqolaning DOI
sahifasini
ochadi

Mustafaeva Raxima, Jumamuratova
Shaxsanem. Infekciya keselligi
tarqalishini matematikaliq modeli //
«O'zbekiston olimi ayollarining
mamlakat taraqqiyotiga qo'shayotgan
hissasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-
amaliy konferensiya materiallari
(Nukus, 2026-yil 9–10-oktyabr). –
Nukus, 2026. – B. 994–997. – DOI:
[https://doi.org/10.66073/ReFocus-
Conf/0910202](https://doi.org/10.66073/ReFocus-Conf/0910202)

INFEKCIYA KESELLIGI TARQALIWINIŇ MATEMATIKALIQ MODELI

Mustafaeva Raxima

fizika -matematika ilimleriniŇ kandidati

Ámeliy matematika hám informatika kafedrası docenti

Jumamuratova Shaxsanem

Ámeliy matematika tálim baǵdarı

2-kurs studenti, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

Annotaciya: Jumısta juqpalı keselliklerdiŇ jabıq populyaciya
tarqalıwın táriypleytuǵın klassikalıq Kermak-Makkendrik SIR modeli
úyrenilgen. Ápiwayı differenciallıq teńlemeler sisteması kórinisindegi
modeldiŇ qoyılıwı keltirilgen. Sonday-aq, sistemanıŇ birinshi integralı kórip
shıǵıladı hám infekciyalanǵanlar funkciyasınıŇ maksimum mánisine erisiw
shártı keltirip shıǵarıladı. SIR modeli ápiwayılıǵına qaramastan, epidemiyalıq
processtiŇ tiykarǵı nızamlıqların adekvat sáwlelendiriwi hám matematikalıq
epidemiologiyanıŇ quramalıraq modelleri ushın tiykar bolıwı kórsetilgen.

Tayanış sózler: SIR modeli, matematikalıq epidemiologiya modeli,
differenciallıq teńlemeler, tiykarǵı reproduktiv san, epidemiya shıńı.

Házirgi waqıtta epidemiyalıq processlerdi modellestiriwge
úlken itibar qaratılmaqta. Ásirese, bul másele COVID-19
koronavirus infekciyasınıŇ tarqalıwına baylanıslı áhmiyetli bolıp
qaldı.

Epidemiya tarqalıwınıŇ klassikalıq hám eń ápiwayı
matematikalıq modeli – bul Kermak-MakendrikniŇ SIR-model
bolıp hám bul model boyınsha bir jerde jasawshı barlıq xalıqtı úsh
toparǵa bóledi:

- **S (Susceptible)** - bul ele awırmaǵan, biraq viruslangan
adam menen ushırasqanda keselleniwi múmkin bolǵan adamlar
sanı.

- **I (Infectious)** - infekciya juqtırǵan hám kesellikti
basqalarǵa tarqatatuǵın juqpalı adamlar sanı.

- **R (Recovered / Removed)** - emlenip, turaqlı immunitetke
iye bolǵan hám infekciya juqtırıp processinen táwir bolıp shıǵıp
ketken (yaki qaytıw bolǵan) adamlar sanı.

Hár bir toparda t -waqıtta baylanıslı adamlar sanınıŇ ózgeriw
processi sıızıqlı emes ápiwayı differenciallıq teńlemeler sisteması
menen táriyplenedi. XalıqtıŇ ulıwma sanı $N = S + I + R = const$
turaqlı bolǵan jaǵdayda, toparlardıŇ sanlı dinamikası ápiwayı
differenciallıq ten'lemeler sisteması menen táriyplenedi[1, 2]:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}$$

- keselleniwi múmkin bolǵan adamlar sanınıŇ
kemeyiw tezligi;

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$$

-infekciya juqtırǵan adamlar sanınıŇ ózgeriw
tezligi;



«O'zbekiston olimi ayollarining
mamlakat taraqqiyotiga
qo'shayotgan hissasi»

XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
NUKUS, 9–10-OKTYABR 2026

$\frac{dR}{dt} = \gamma I$ adamlar $\acute{n}$ emlenip, sawal $\acute{g}$ anlar toparına $\acute{o}$ tiw tezligi.

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

Bunda β (infekciya juqturıw koefficienti) - bul bir adamnıń bir birlik waqıt momentindegi ortasha kontaktlar sanın k $\acute{o}$ rsetedi, γ (tawir bolıw koefficienti) - keselliktiń ortasha waqıtına keri bol $\acute{g}$ an shama.

Tiykargı infekciyalan $\acute{g}$ an adamlar $\acute{n}$ kobeyiwıń R_0 sanı, bunda $R_0 = \beta / \gamma$ qatnası sıpatında esaplanadı. Ol $\acute{o}$ ziniń keselligi dawamında, bir nawqas adam ortasha qansha adam $\acute{g}$ a infekciyanı juqturıwı m $\acute{u}$ mkin ekenligin k $\acute{o}$ rsetedi. Eger $R_0 > 1$ bolsa, onda kesellik tarqaladı h $\acute{a}$ m epidemiya baslanadı, al $R_0 < 1$ bolsa, epidemiyanıń tarqalıwı toqtaydı[2].

Bunda

$$\frac{d}{dt}(S + I + R) = -\frac{\beta SI}{N} + \frac{\beta SI}{N} - \gamma I + \gamma I = 0.$$

Demek, $S(t) + I(t) + R(t) = \text{const}$ turaqlı boladı. Al bul bolsa R parametrdi shı $\acute{g}$ arıp taslaw $\acute{g}$ a h $\acute{a}$ m eki teńleme menen islew imkaniyatın beredi.

$S'(t) = -\frac{\beta SI}{N} \leq 0$, $R'(t) = \gamma I \geq 0$ bol $\acute{g}$ anı sebepli, $S(t)$ funkciyası monoton kemeyiwshi h $\acute{a}$ m $R(t)$ monoton $\acute{o}$ siwshi funkciyalar boladı.

Ekinshi teńlemenı birinshi teńlemege b $\acute{o}$ lip, t $\acute{o}$ مندegi qatnasına iye bolamız:

$$\frac{dI}{dS} = -1 + \frac{N}{R_0 S}.$$

Bul qatnasın integrallasaq, onda sistemanıń birinshi integralına iye bolamız:

$$I(S) = I_0 + S_0 - S + \frac{N}{R_0} \ln \frac{S}{S_0}$$

Ekinshi teńlemeden $t = 0$ h $\acute{a}$ m $S_0 \approx N$ bol $\acute{g}$ anda:

$$I'(0) = I_0 \left(\frac{\beta S_0}{N} - \gamma \right) \approx \gamma I_0 (R_0 - 1).$$

Eger $R_0 > 1$ bolsa, onda $I'(0) > 0$ – bunda virus juqqanlar sanı artıp, epidemiya keselligi tarqalıp baslaydı. Eger $R_0 < 1$ bolsa, onda $I'(0) < 0$ – demek epidemiya keselligi dáslepki kúnnen baslap-aq toqtaydı. Bul Kermak-Makkendriktiń shegara teoreması.

$I(S)$ funkciyanıń maksimum mánisin izertleymiz

$$\frac{dI}{dS} = 0 \quad S^* = \frac{N}{R_0}$$

Ekinshi tuwındısı tómendegishe boladı:

$$S > 0 \text{ da } \frac{d^2 I}{dS^2} = -\frac{N}{R_0 S^2} < 0$$

Ekinshi tuwındı barlıq waqıtta teris mánisine iye bolǵanlıqtan tabılǵan $S^* = \frac{N}{R_0}$ noqat qatań maksimum noqatı boladı. Fazalıq traektoriya teńlemesine S^* mánisin aparıp qoyamız hám infekciyalanǵan adamlardıń $I_{\max}$ eń joqarı sanı ushın tómendegi ańlatpasına iye bolamız:

$$I_{\max} = I_0 + S_0 - \frac{N}{R_0} \left(1 + \ln \frac{R_0 S_0}{N} \right)$$

Bunnan áhmiyetli epidemiologiyalıq juwmaq kelip shıǵadı: egerde S -topardaǵı adamlar sanınıń úlesi $\frac{1}{R_0}$ muǵdarına shekem kemeygen waqıt momentinde, epidemiya maksimum mánisine erisedi. $1 - \frac{1}{R_0}$ muǵdar jámaátlik immunitet shegarası dep ataladı. Epidemiya menen awırıp táwir bolǵan hám vakcina alǵan adamlardıń sanı usı úlesine jetkennen keyin, aktiv (awırǵan) nawqaslardıń sanı azaya baslaydı [1,2].

SIR sisteması elementar funkciyalarda sheshimge iye emes, sonıń ushın h adımlı Eyler usılınan qollanıladı.

Meyli $N = 1000$, $I_0 = 1$, $\beta = 0,4 \text{ kun}^{-1}$, $\gamma = 0,1 \text{ kun}^{-1}$, $R_0 = 4$. Keselliktiń ortasha dawamlılıǵı 10 kún.

Analitikalıq bahalaw júrgiziwde eń joqarı dárejesi $S' = 250$, $I_{\max} = 400$, emlenip shıqqanlardıń úlesi $\approx 98\%$.

Juwmaqlaw. Epidemiya keselliginiń tarqalıwınıń SIR modeli ápiwayı bolıwına qaramastan epidemiyalıq processlerdiń tiykarǵı nızamlılıqların durıs kórsetedi hám zamanagóy matematikalıq epidemiologiyanıń fundamenti bolıp esaplanadı.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. Ризниченко Г.Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в биофизике и экологии: учеб.пособие.-М. : Изд-во Юрайт, 2019.- 181 с.
2. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии М.-Ижевск, ИКИ, 2003.