



QR-kod
maqolaning DOI
sahifasini
ochadi

Saitnazarova Gulmira Rapatdinovna.
Erte jastağı balalarda ishek
mikrobiomasınıń qalıplesiwinde
kókirek súti menen awqatlandırıwdıń
roli: zamanagóy maǵlıwmatlardıń
keńeytilgen sholıwı // «O'zbekiston
olima ayollarining mamlakat
taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materialları (Nukus, 2026-
yıl 9–10-oktyabr). – Nukus, 2026. –
B. 1178–1181. – DOI: <https://doi.org/10.66073/ReFocus-Conf/0910241>



«O'zbekiston olim ayollarining
mamlakat taraqqiyotiga
qo'shayotgan hissasi»

XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
NUKUS, 9–10-OKTYABR 2026

UDK: 613.287.8:579.61:616.34-053.2

ERTE JASTAĞI BALALARDA ISHEK MIKROBIOMASINIŇ QÁLIPLESIWİNDE KÓKIREK SÚTI MENEN AWQATLANDIRIWDIŇ ROLI: ZAMANAGÓY MAǒLIWMATLARDIŇ KEŇEYTIŁGEN SHOLIWI

Saitnazarova Gulmira Rapatdinovna

Anatomiya, klinik anatomiya hám gistologiya kafedrası morfologiya
qaniygeligi magistrantı

Qaraqalpaqstan medicina institutı

e-mail: gulmirasaitnazarova8@gmail.com

Annotaciya: Sońǵı jıllarda salamat náreste ishek mikrobiomın jaratıwda kókirek súti menen azıqlantırıwdıń tiykarǵı roli tán alınbaqta. Kókirek súti quramında hár qıylı komponentler, beloklar, maylar, uglevodlar hám immunoglobulinlerdi óz ishine alǵan. Kókirek sútinin áhmiyetli quram bólegi HMOLar, máselen GOS bolıp, olar jıńışke ishekte shala sińiriledi hám tiykarınan juwan ishekke jetip baradı. Ishek mikrobiomi tiykarınan erte jasta qalıpleseıdi hám organizm gomeostazın saqlawda áhmiyetli rol oynaydı. Ishektiń dáslepki kolonizaciyası balanıń immun sisteması rawajlanıwı, metabolik procesler hám neyropsixik rawajlanıwına tásir kórsetedi. Kókirek súti menen awqatlandırıw ishek mikrobiomasınıń qalıplesiwine tásir etiwshi eń áhmiyetli faktorlardan biri esaplanadı, sebebi ana súti tek azıqlıq zatlardı emes, al paydalı mikrofloranıń qalıplesiwine járdem beriwshi biologiyalıq aktiv komponentlerdi de óz ishine aladı.

Tayanış sózler: kókirek súti menen awqatlandırıw, ishek mikrobiomi, kishi jastağı balalar, mikrobiota, immunitet.

Kirisıw. Zamanagóy izertlewler sonı tastıyıqlaydı, ana súti tek ǵana azıqlıq zatlar hám biologiyalıq aktiv komponentler deregi emes, al balanıń ishek mikrobiomın qalıplestiriwde qatnasatuǵın tiri mikroorganizmlerdiń áhmiyetli deregi bolıp tabıladı [1,2]. Náresteler ishek mikrobiomi insan organizminiń salamat rawajlanıwında tiykarǵı rol oynaydı hám kóplep jollar arqalı awqatlanıw ádetleri tásirinde boladı. Birinshiden, hámiledarlıq waqtında ananıń awqatlanıwı hám náresteniń awqatlanıwı náresteniń ishek mikrobiotasına úlken tásir kórsetedi. Bunnan tisqari, emiziw paydalı bakteriyalardıń kóbeyiwın támiyinleydi, jasalma azıqlandırıw bolsa mikrobılardıń hár túrliligın arttıradı. Qattı awqatlardı beriw waqtında da ishek mikrobiotası quramına tásir kórsetedi.

Aldın sút steril dep esaplangan bolsa, endi onıń quramında hár qıylı mikroblıq jámiechilik bar ekenligi anıqlandı. Ana sútinde Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus hám Staphylococcus sıyaqlı hár qıylı bakteriya túrleriniń wákılleri anıqlangan [3]. Bul mikroorganizmler jańa tuwılǵan náresteniń ishekleriniń dáslepki kolonizaciyasında áhmiyetli rol oynaydı hám turaqlı hám funktsional aktiv mikrobiotanıń qalıplesiwine járdem beredi.

Mikrobiotaniń anadan balaǵa juǵıwınıń tiykarǵı mexanizmlerinen biri enteromammary jol esaplanadı, bunda ananıń isheklerinen bakteriyalar sút bezine ótedi hám keyin ana súti arqalı balaǵa juǵadı[4]. Bunnan tısqari, ana hám bala arasındaǵı teri baylanısı, sonday-aq, qorshaǵan ortalıq áhmiyetli rol atqaradı.

Emiziw bifidobakteriyalar ústemlik etetuǵın mikrobiota qalıplesiwine járdem beredi, bul tómendegiler menen baylanıslı.

isiniwge qarsı tásir hám juqpalı kesellikler qáwpın kemeyttiredi [5]. Ana súti mikroorganizmleriniń oligosaxaridler (HMO) menen óz ara táhiri paydalı mikrofloraniń ósiwin kúsheytedi hám patogenlerdiń rawajlanıwın bastıradı.

Sonday-aq mikrobiotaniń bar ekenligi kórsetilgen. Ana súti tásir etiwı mımkin tuwma hám iykemlesiwshi immunitet reaksiyasın modulyaciyalaw [6].

Solay etip, ana súti mikrobiota deregi sıpatında áhmiyetli rol atqaradı, paydalı mikroorganizmlerdiń ótiwin támiyinleydi hám balada salamat ishek ekosistemasınıń rawajlanıwına járdem beredi.

Materiallar hám usıllar. 2020-2023-jılları basıp shıǵarılǵan ilimiy ádebiyatlar saylandı. Izertlew jumısıları PubMed, Scopus hám Web of Science maǵlıwmatlar bazalarında alıp barıldı. Sholıwǵa sistemalı sholıwlar, kogort izertlewler hám randomizatsiyalangan kontrollı izertlewleri kirgizildi. Tańlap alıw joqarıdaǵı tayanış sózler tiykarında ámelge asırıldı: breastfeeding, gut microbiome, infant microbiota, early life. Kishi jastaǵı balalarda ishek mikrobiomınıń qalıplesiwinde emiziwdiń roli, sonday-aq, onıń immun, metabolik hám neyropsixologiyalıq rawajlanıwǵa tásirin bahalawǵa baǵışlangan original izertlewler nátiyjelerin óz ishine alǵan 10 baspalardı analizledik.

Nátiyjeler. Ádebiyatlardı talqılaw sonı kórsetti, kókirek súti menen awqatlandırıw ishek mikrobiotasınıń quramı hám funksional aktivligine sezilerli tásir kórsetedi. Ana súti quramında prebiotik wazıypasın atqaratuǵın oligosaxaridler bar bolıp, olar: bifidobakteriyalar hám basqa kommensal mikroorganizmler ósiwin stimullaydı. Kókirek súti menen emizilgen balalarda paydalı mikroflora ústin bolǵan jáne de turaqlı mikrobiom payda bolıwı anıqlanǵan, bul bolsa isiniw proceslerin kemeyttiredi hám ishektiń barer funkciyasın bekkemlewge járdem beredi. Sonday-aq, ishek mikrobiotası qısqa shinjırlı may kislotaların sintezlewde qatnasadı, olar immun juwap hám metabolik proceslerdi tártipke saladı. Kókirek súti menen emiziw "ishek-miy kósheri" qalıplesiwine de tásir kórsetip, optimal neyro rawajlanıwdı támiyinleydi hám neyropsixikalıq buzılıwlar qáwpın azaytadı. Házirgi izertlewlerge qaraǵanda, ómirdiń dáslepki dáwirinde ishek mikrobiotasınıń rawajlanıwındaǵı úzilisler juqpalı hám allergiyalıq kesellikler, funksionallıq asqazan-ishek kesellikleri hám metabolik keselliklerdiń rawajlanıwına hám erte, hám keyingi ómirde úles qosıwı mımkin [7,8]. Usı kózqarastan, emiziw qolaylı mikrobılıq profildi rawajlandırıw hám bul qáwıplerdi azaytıwda tiykarǵı faktor bolıp esaplanadı. Nárestelerde ishek mikrobiotasınıń quramı hám funksional aktivligine hámiledarlıq ózgeshelikleri, ana salamatlıǵı, tuwıw usılı, antibiotiklerden paydalanıw hám qorshaǵan ortalıq sharayatlardı sıyaqlı bir qatar faktorlar tásir kórsetedi [9]. Biraq, awqatlanıw túri, atap aytqanda, emiziw, biologiyalıq aktiv komponentler hám kommensal mikroorganizmlerdiń qabıl etiliwi sebepli mikrobiotaniń qalıplesiwinde jetekshi rol oynaydı. Bar maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, jańa tuwılǵan balanıń

isheklerini kolonizatsiyasi anani, dietani, farmakologiyaliq ham basqa da qorshagan ortalik faktorlarini, soni ishinde, uy haywanlarini bar ekenligi siyaqli uy sharayatidagi faktorlarni tasi menen belgilenetugin de mikrobiota qaliplesiw procesi bolip tabiladi [10].

Juwmag ham usinilar. Kókirek suti menen awqatlandirw ishek mikrobiomasini qaliplesiwinde ayriqsha ahmiyetke iye bolip, bala salamatligina kompleks tasir korsetedi. Omirdi dáslepki dawirinde ishek mikrobiomini rawajlanw bala densawligina uzaq muddetli tasir korsetetugin quramali ham kop faktorli process. Emiziw bul processe ahmiyetli rol atqaradi, tek gana azizlik zatlardi emes, al qolayli mikrobiota qaliplesiwine ules qosatugin biologiyaliq belsendi komponentler ham mikroorganizmlerdi de tamiyinleydi.

Kókirek suti menen awqatlanatugin narestelerde mikroblq profil turaqlraq ham funksional jaqtan optimal ekenligi, bifidobakteriyalarni ustinligi baqlangan, bul bolsa ishek tosiq funksiyasini kusheyiw, immun juwabini modulyaciyalangan ham isiniw proceslerini qawipti kemeyiw menen baylanisli. Kerisinshe, jasalma azizlandirw mikrobiotani ozgeriwshenligi ham opportunistlik patogenler ulesini artiw menen baylanisli. Ol immun sisteması rawajlanwına, metabolik teńsalmaqlılıqtı saqlawga ham normal neyropsixik rawajlanwga tasir korsetedi. Kókirek suti menen emiziwdi qollap-quwatlaw profilaktikalıq medicinani ahmiyetli bagdarlarinan biri bolip esaplanadi. Erte jastagi keselliklerdi aldın alw ham emlew ushin mikrobiomga bagdarlangan natiyjeli strategiyalardi islep shigw maqsetinde qosimsha izertlewler zarur.

Paydalanilgan adabiyatlar

1. Binda, S., Hill, C., Johansen, E., Obis, D., Pot, B., Sanders, M. E., Tremblay, A., & Ouwehand, A. C. (2021). Human milk microbiota: Recent advances. *Frontiers in Microbiology*, 12, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.629000>
2. Stinson, L. F., Gay, M. C. L., & Koleva, P. T. (2021). The human milk microbiome: Who, what, when, where, why, and how? *Trends in Microbiology*, 29(7), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2020.12.003>
3. Rodríguez, J. M. (2020). The enteromammary pathway: Origin of bacteria in breast milk. *Nutrients*, 12(3), 784. <https://doi.org/10.3390/nu12030784>
4. Fitzstevens, J. L., Smith, K. C., Hagadorn, J. I., et al. (2021). Systematic review of the human milk microbiota. *Nutrients*, 13(3), 1053. <https://doi.org/10.3390/nu13031053>
5. Laursen, M. F. (2021). Gut microbiota development in early life. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 77(Suppl. 3), 2–8. <https://doi.org/10.1159/000518220>
6. Chong, C. Y. L., Bloomfield, F. H., & O'Sullivan, J. M. (2023). Human milk oligosaccharides and the infant gut microbiome. *Nutrients*, 15(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/nu15020432>
7. Robertson R.C., Manges A.R., Finlay B.B., Prendergast A.J. The human microbiome and child growth. *Trends Microbiol.* 2019;27(2):131–147. DOI: 10.1016/j.tim.2018.09.008
8. Stiemsma L.T., Michels K.B. The role of the microbiome in the developmental origins of health and disease. *Pediatrics.* 2018;141(4): e20172437. DOI: 10.1542/peds.2017-2437
9. Arrieta, M. C., Stiemsma, L. T., Amenyogbe, N., et al. (2021). The intestinal microbiome in early life: Health and disease. *Nature Medicine*, 27, 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-01142-2>

10. Tapiainen T, Paalanne N, Tejesvi MV, et al. Maternal influence on the fetal microbiome in a populationbased study of the first pass meconium. *Pediatr Res.* 2018;84(3):371–379. DOI: 10.1038/ pr.2018.29