



QR-kod
maqolaning DOI
sahifasini
ochadi

Sultanbaeva Fatima Árepbay qızı,
Tóreniyazov Elmurat Sherniyazovich.
Qaraqalpaqstan sharayatında gúnji
ziyankeşleri hám olardıń keltiretuǵın
ziyanın anıqlaw // «O‘zbekiston olimi
ayollarining mamlakat taraqqiyotiga
qo‘shayotgan hissasi» mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari (Nukus, 2026-yil 9–10-
oktyabr). – Nukus, 2026. – B. 1266–
1268. – DOI: [https://doi.org/](https://doi.org/10.66073/ReFocus-Conf/0910260)
10.66073/ReFocus-Conf/0910260

QARAQALPAQSTAN SHARAYATÍNDÁ GÚNJI ZÍYANKESLERI HÁM OLARDÍŇ KELTIRETUǴÍN ZÍYANÍN ANÍQLAW

Sultanbaeva Fatima Árepbay qızı¹

tayanish doktorant

Tóreniyazov Elmurat Sherniyazovich²

a.x.i.d., professor

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutı

e-mail: elmurat1960@umail.uz

Annotaciya: Maqalada Qaraqalpaqstan sharayatında gúnji ósimligi biocenozında payda bolatuǵın ziyankeşler túrlerin anıqlaw hám olarǵa qarşı gúres ilajların islep shıǵıw boyınsha alıp barılıp atırǵan izertlew nátiyjeleri kiritilgen.

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog‘iston sharoitida kunjut o‘simligi biotsenozida paydo bo‘ladigan zararkunandalar turlarini aniqlash va ularga qarshi kurash tadbirlarini ishlab chiqish bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlar natijalari kiritilgan.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по выявлению видов вредителей, возникающих в биоценозе растения кунжута в условиях Каракалпакстана, и разработке мер борьбы с ними.

Abstract: The article presents the results of ongoing research on identifying pest species appearing in the sesame plant biocenosis under the conditions of Karakalpakstan and developing control measures against them.

Gilt sózler: Ziyankeş, túri, hawa, topıraq, temperatura, ıǵallıq, sorıwshı, kemiriwshı, jańa túrleri, bioekologiya, dinamika.

Kalit so‘zlar: Zararkunanda, turi, havo, tuproq, harorat, namlik, so‘ruvchi, kemiruvchi, yangi turlari, bioekologiya, dinamika.

Ключевые слова: Вредители, виды, воздух, почва, температура, влажность, сосущие, грызущие, новые виды, биоэкология, динамика.

Keywords: Pest, species, air, soil, temperature, humidity, sucking, gnawing, new species, bioecology, dynamics.

Kirisiw. Qaraqalpaqstan agrobiocenozi mikroiqlım hám topıraq sharayatında kóp jıllardan berli belgili maydanlarǵa egilip kiyatırǵan gúnji ósimliginiń egis maydanın keńeytirip, jańa sortların shıǵarıp, alınatuǵın ónimniń ornın qaplaw tiykarǵı jumıslar retinde qolǵa alınıp, qısǵa múddetlerde óz nátiyjelerin bermekde.

Gúnji ósimligi bioekologiyasındaǵı tiykarǵı qásiyetlerinen esaplangan ıssılıqtı, jaqtılıqtı súyiwshı, ıǵallıqǵa bolǵan talabı biraz pás, qısqa vegetaciya dáwirine iye túr esabında qoyılıp otırǵan talaplarǵa tolıq juwap beretuǵınlıǵı menen áhmiyetke iye bolmaqda.

Kórsetilgen egin túri sortlarınıń áhmiyetli tamanları menen birge, gúnji biocenozında, usınday mikroiqlım sharayatına beyimlesken awıl xojalıǵı eginleri ziyankeşleriniń kóplegen túrleri toplanıp, tiykarǵı ornı esabında keń maydanlarǵa tarqalıp úlken ziyan keltiriwi menen ajralıp turatuǵınlıǵı málim boldı.



«O‘zbekiston olimi ayollarining
mamlakat taraqqiyotiga
qo‘shayotgan hissasi»

XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
NUKUS, 9–10-OKTYABR 2026

Avıl xojalıǵı tarawın sońǵı jıllardaǵı ekologiyalıq qıyınshılıqtan shıǵarıw boyınsha alǵa súrilgen baǵdarlardaǵı keri tásir etip atırǵan gúnji zıyankeslerine qarsı alıp barılatuǵın gúres ilajların ilimiy tiykarda islep shıǵıp, óndiriske usınıw búgingi kúndegi eń aktual másele bolıp turıptı.

Material hám usıllar: Egilip atırǵan gúnji sortlarına qollanılatuǵın agrotexnikalıq ilajlar [2,6] biocenozdıń zıyankes hám entomoakarifagları túrlerin anıqlaw [1], keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesi [5] zıyan keltiriwi boyınsha dominant túrlerine qarsı gúres [4,7] ilajların qollanıw arqalı alıp barıldı.

Nátiyje hám onı talqılaw: Qaraqalpaqstan agrobiocenozi arqa rayonlarında tiykarǵı maydanlarǵa egilip atırǵan gúnji sortları tiykarınan orta hám kesh egis múddetleri retinde ámelge asırılatuǵın agrotexnikalıq ilajlar islep shıǵılǵan. Alıp barılǵan baqlawlar nátiyjesinde aymaq sharayatında egilip atırǵan gúnji sortları tuqımı hawa temperaturasınıń ortasha kúnlık dárejesi 15-16°C dan kóterilgende egiletuǵınlıǵı málim boldı. Vegetaciya dáwiri 90-110 (kesh sortlarında 120-150) kún esaplanıp, tiykarǵı ónimi azıqlıq ushın may zatları alınadı. Tuqımı quramında 65% may, 16-19% belok, 16-17% azotsız zatlar bar ekenligi, azıq-awqat sanaatında, konserva hám konditer ónimlerin islep shıǵarıwda, medicinada, parfyumeriyada, tazalanǵan hám maydalanǵan tuqımı joqarı sortlı halwalar tayarlawda, nan jabıwda isletile alatuǵın unamalı tárepleri, biocenozda kóplegen awıl xojalıq eginleri zıyankesleriniń toplanıp, zıyan keltiretuǵınlıǵın tastıyıqladı.

Bul boyınsha Respublikamızdıń arqa rayonları atızlarına egilip atırǵan gúnji sortları biocenozınıń tiykarǵı zıyanlı aǵzaları esabında gúzlik sovka (*Agrotis segetum* Den. et Schif.), úndew belgisi bar sovka (*Agrotis exclamationis* L.), karadrina (*Spodoptera exigua* Hb.), gamma sovkası (*Phytometra gamma* L.), jabayı sovka (*Agrotis conspicua* Hb.), temeki tripsi (*Thrips tabaci* Land.), palız shırınjası (*Aphis gossypii* Glov.), akaciya yaki jońıshqa shırınjası (*Aphis medicaginis* Koch.), órmekshi kene (*Tetranychus urticae* Koch.), ıssıxana aqqanatı (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), temeki yaki ǵawasha aqqanatı (*Bemisia tabaci* Genn.), jońıshqa qandalası (*Adelphocoris lineolatus* Goeze.), dala qandalası (*Lygus pratensis*.) zıyankesleri anıqlandı. Usılar menen bir qatarda entomoakarifaglardan *trixogramma-Trichogramma evanescens* West., altınkóz-*Chrysopa carnea* Steph., enkarziya-*Encarsia formosa* Gahan., qan qızı-*Coccinella septempunctata*, stetorus qońızı-*Stethorus punctillum* Ws., atız sekirgishi-*Cicindela campestris* L., stafilinid- *Staphylinidae*, apanteles- *Apanteles ruficus* Hol., fitoseyulyus-*Phytoseiulus persimilis* Ath-Henr., sirfid shıbını yaki jurchalka-*Scaeva pyrastris* L., taxina shıbını-*Clytiomyia helluo* F., gallic afidimiza-*Aphidoletes aphidimyza* Rand., túrleri de tiykarǵı izertlew ob`ekti esabında úyrenilip kelinbekde.

Gúnji sortları, basqa eginlerge salıstırǵanda biraz kesh egiletuǵın bolǵanlıqtan dáslepki nál kógeriw waqtında, aymaǵımızdıń tiykarǵı kemiriwshi zıyankesi esaplangan gúzlik sovka hám úndew belgisi bar sovka túrleriniń 2-áwladınan baslap toplanıp, qurtları sanı ayırım atızdıń 1 m² maydanında 1,2-1,4 danaǵa deyin jetetuǵınlıǵı hám may-iyun aylarında karadrina zıyankesi 0,2-4,5 danaǵa shekem tarqalıp gúnji ósimligine zıyan bergenligi anıqlandı. Bunday

atızlardağı gúnji nálleriniń siyreklesiwi, zıyanlangan hasıldın ósip-rawajlanıwdan artta qalıwı esabınan gektarınan alınatuǵın hasıl nabit bolatuǵınlıǵı anıqlandı.

Gúnji atızlarında kemiriwshi sovkalar qurtları tásirinen nabit bolıp atırǵan hasıldı saqlap qalıwdağı biologiyalıq gúres ilajınıń biologiyalıq paydalalıq tamanların úyreniw boyınsha tájiriybeler alıp barılmaqda. Atızlardağı gúnji ósimliginiń nálleri kógerip, 10-12 japıraq shıǵarǵanǵa deyingi fazalarında payda bolǵan sovka máyekleri sanı esaplap barıldı. Belgili dárejege jetken atızlardağı sovka máyeklerine qarsı biolaboratoriyada kóbeytirilgen trixogrammanıń erjetken áwladlarınan gektarına 200000 dana esabında, berilgen usınıslar tiykarında atızlarǵa tarqatıp barıldı. Óz waqtında entomofag tarqatılǵan atızlardağı máyeklerdiń, aradan 10 kún ótkende 48,9 %, 20 kún ótkende 59,9 % hám 30-kúni 77,9 % trixogramma menen zıyanlanganlıǵı málim boldı. Islep shıǵılǵan qarsı gúres ilajın óndiriste qollanıw ushın usınıslar berilip, búgingi kúnde keń maydanlarǵa endirilmekde.

Juwmaq hám usınıs: Qaraqalpaqstan sharayatında egilip atırǵan gúnji ósimliginiń egiw múddetlerine baylanıslı kóplegen zıyankesler payda bolıp biocenzdın tiykarı bólimi sıpatında ósimliklerge kerı tásir etetuǵın biotikalıq faktorlardan birine aylanatuǵınlıǵı esapqa alındı. Usınday qáwipli túrlerden esaplangan, kemiriwshi sovkaların gúbelekleri máyek qoyıp atırǵan atızları anıqlanıp, biolaboratoriyalarda órshitilip atırǵan trixogrammanı tarqatıp barıwdın abzallıqların esapqa alıp, gektarına 200000 dananı, úsh márte bólip jiberilgende, qurtları máyekden shıqbasdan nabit bolıp, keltiriletuǵın zıyanlılıq dárejesiniń tolıq aldın alına.

Egerde gúnji atızlarında tarqalǵan zıyankeslerdiń sanı zıyanlılıqtın ekonomikalıq shegarasına artıp barıw qáwpi payda bolǵan jaǵdayda, gúnji ósimliginiń zıyankeslerine qarsı qollanıw usınıs etilgen parazit hám jırtqısh entomoakarifaglardan birewin tańlap, biocenzdağı paydalı makro, mikro deneshelerge kerı tásir etpeytuǵın usıllarda qollanıw usınıs etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Adashkevich B.P. «Biologicheskaya zashita krestocvetnix ovoshnix kul'tur ot vrednix nasekomix». –Tashkent: «FAN», 1983. –S. 180-188.
2. Azizov T.B. «Kunjutdan mwl hosil etishtirish bwyicha tavsiyalar». Toshkent 2008 yil 20 b.
3. Dospexov B. A. Metodika polevogo opita. - M.: Kolos, 1986.-351b.
4. Kimsanboev X.X. Biolaboratoriyalarda entomofaglarni kwpaytirish. –Toshkent: «O'qituvchi», 2000. –B. 3-32.
5. Tanskiy V.I. Biologicheskaya osnova vredonosnosti nasekomix. - M.. «Agropromizdat», 1988.-S 182-198.
6. Toreniyazov E.Sh., Xo'djaev Sh.T., Xolmurodov E.A. O'simliklarni himoya qilish.- Toshkent: «NAVRUZ» -2018.-876 b.
7. Xo'jaev Sh.T. Agrotoksikologiya asoslari hamda tadqiqot ótkazish qoidalari. – Toshkent: «Munis design group» MChJ, 2018. –B. 4-132.